



Clinique St Jean de Dieu
19, rue Oudinot
75007 Paris
Tel : 01 40 61 11 00
Fax : 01 40 61 11 11


La chambre à cathéter implantable (PAC)

LA CHAMBRE A CATHETER IMPLANTABLE

La chambre à cathéter implantable est composée de deux parties :

Le cathéter, tube souple et fin, est introduit dans une grosse veine (veine latérale du cou, veine sous la clavicule, veine du pli de l'aîne). L'extrémité est alors connectée à **la chambre** (petit boîtier fermé par une membrane).

La chambre est placée sous la peau, généralement sous la clavicule. Ce dispositif est discret. Il restera en place au moins pendant toute la durée du traitement.



POURQUOI ?

Ce dispositif permet d'accéder directement au système veineux central.

Les injections nécessaires à votre traitement sont alors réalisées sans douleur, avec un maximum de sécurité et de confort (bras libres).

Ce système peut parfois être utilisé pour les prises de sang.

COMMENT VOUS PREPARER A LA POSE ?

La pose de la chambre à cathéter implantable s'effectue le plus souvent sous anesthésie locale, parfois sous anesthésie générale. Vous serez alors pris en charge en hospitalisation ambulatoire et pourrez sortir le jour même, après un contrôle radiologique et l'accord médical.

MEDICAMENTS

Si vous prenez un **traitement pour fluidifier le sang** (anti-coagulant, anti-agrégant), signalez-le à l'anesthésiste avant l'intervention.

REPAS

- Anesthésie locale : il n'est pas nécessaire d'être à jeun.
- Anesthésie générale : restez à jeun (ni solide, ni liquide, ni chewing-gum, ni tabac 6 heures avant).

DOUCHES

Corps : la veille et le matin de l'intervention, prenez une douche avec de la BETADINE scrub®.

Cheveux : le matin de l'intervention, lavez-vous les cheveux avec votre shampoing habituel.

VETEMENTS, BIJOUX ET MAQUILLAGE

Le jour de l'intervention : vêtissez-vous de linge propre, ne portez ni bijoux ni maquillage.

DOCUMENTS A APPORTER

Si des examens sanguins vous ont été prescrits au préalable, apportez les résultats.

ARRIVEE A LA CLINIQUE

Vous serez contacté la veille de l'intervention et l'heure d'arrivée à la clinique vous sera indiquée : restez donc joignable.

SORTIE

Si la chambre est posée sous anesthésie générale, en hospitalisation ambulatoire, vous devez être accompagné pour votre sortie ou prévoir de repartir en taxi (appelé par la clinique).

DOULEUR

Dans les 48 heures suivant la pose, une douleur locale (éventuellement une ecchymose), liée à l'intervention, est banale. Elle est d'intensité modérée et facilement contrôlée par des antalgiques simples : Effergal®[®], Diantalvic®. **Au-delà des premiers jours**, une chambre à cathéter implantable n'est pas douloureuse (si elle est l'est : voir ci-dessous).

LES SOINS

De la pose jusqu'à la cicatrisation (environ 7 jours), un pansement sera appliqué sur la chambre. Si les fils utilisés ne sont pas résorbables, ils seront enlevés après cicatrisation. **Puis, la chambre à cathéter implantable ne nécessite plus de soins ou pansements particuliers.**

VIE QUOTIDIENNE

Le port de ce système ne va pas modifier votre vie courante. Cependant, quelques précautions sont à prendre. En cas de doutes, adressez-vous à l'équipe soignante de la clinique.

Ne pas faire :	Après cicatrisation, pas de contre-indication pour :	Conseils
De sports violents (rugby...) De sports entraînant des mouvements de traction importants sur le dispositif (tennis, golf...) De plongée sous-marine (problèmes de pression) De mouvements répétés et violents, de chocs	Les douches Les bains La ceinture de sécurité Les sports non violents (natation...) Les portes de détection des aéroports	Préférer les vêtements amples (coton /soie) Signaler le dispositif lors d'une exploration médicale

LA DEPOSE

Quand votre traitement est terminé et que votre oncologue l'autorise, le dispositif est enlevé, sous anesthésie locale. Il laisse une fine cicatrice.

DES COMPLICATIONS PEUVENT SURVENIR

Les complications sont rares. Une hospitalisation ou l'ablation du dispositif peuvent cependant être nécessaires. Les complications peuvent être liées à la pose ou à l'utilisation du dispositif :

Dans les 48 heures suivant la pose, il existe un risque très faible d'épanchement dans la plèvre (hémothorax/pneumothorax).

Au-delà de ces 48 heures, les risques principaux sont l'infection (locale/générale) et l'obstruction du cathéter (par médicament/caillot de sang). **De façon plus rare**, il existe un risque de thrombose (caillot) de la veine (exceptionnellement, il peut se diriger vers la circulation pulmonaire et provoquer une embolie). L'extravasation (passage du produit en dehors du dispositif) peut provoquer une simple rougeur avec gonflement ou, une nécrose plus ou moins étendue des tissus.

D'autres risques exceptionnels existent (compression du cathéter entre la côte et la clavicule, rupture du cathéter ou de la connexion entre la chambre et le cathéter, érosion de la peau).

LES SIGNES QUI DOIVENT VOUS AMENER A CONSULTER :

Contactez en urgence le médecin implanteur ou le centre hospitalier le plus proche, en cas de :

- **Toux, douleur au niveau du thorax (surtout lors des mouvements respiratoires), gêne respiratoire : dans les 48 heures suivant la pose**

Contactez votre médecin traitant, ou le médecin implanteur, ou le service d'oncologie de la clinique Saint Jean de Dieu, en cas de : (Service d'oncologie : 01 40 61 46 70 / Après 20h et le week-end : 01 40 61 11 00)

- **Saignement ou hématome important : dans les 48 heures après la pose**
- **Douleur ou rougeur ou empatement et gonflement au niveau de la chambre, du trajet du cathéter, de la base du cou, du bras : plus de 48 heures après la pose ou lors des injections de produit**
- **Température (supérieure à 38,5°C) ou écoulement au niveau de la chambre**